herpy

SKINKAR

Tribolonotus ponceleti

Tribolonotus ponceleti är en sällsynt, gömd skink från öarna i Salomonöarnas ögrupp och den största arten i sitt släkte. Den har kölade, taggiga fjäll och ett kantigt, pansrat huvud, lever i skogsbotten och gräver ner sig, och den kan ge ifrån sig läten. Skötseln bygger på klimatet och på de nära släktingarna *Tribolonotus gracilis* och *Tribolonotus novaeguineae*.

Familj: Scincidae Engelska: Giant Spiny Skink Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**11-13 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**75 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Värmeplats	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**65-85 dagar** vid 23-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Kunskapsbrist (DD)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns mycket lite kunskap om skötseln av *Tribolonotus ponceleti*. Klimatet i utbredningsområdet är varmt och fuktigt hela året, och arten lever i skogsbottnens löv.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 24-27 °C i den svala änden och 27-28 °C i ett varmt gömsle, och låt temperaturen sjunka till 22-24 °C på natten. Skinken är aktiv i skymningen och på natten och solar sig knappast, utan värmer sig i gömslen.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara 70-80 % på dagen och högre på natten, gärna 80-90 %, och bottensubstratet ska alltid vara fuktigt. Arten tål sannolikt uttorkning mycket dåligt, liksom de nära släktingarna.

LJUS OCH UVB

Djuret är aktivt i skymningen och på natten, och behovet av UVB är inte dokumenterat. Hos de nära släktingarna kan djuren klara sig utan UVB när fodret får kalk och D3-vitamin, men ett svagt UVB-ljus rekommenderas.

UTFODRING

Arten äter leddjur i naturen. Grundfodret kan vara syrsor, kackerlackor, mjölmaskar, sidenspinnarlarver, larver av soldatflugan, daggmaskar och snäckor. Variation är viktigt, och daggmaskar får oftast fram ett gömt djur.

BETEENDE OCH HANTERING

Tribolonotus ponceleti är ett djur att titta på och inte för hantering. Skinkar i släktet spelar död, försöker fly, släpper svansen eller ger ifrån sig läten när de blir gripna, och det stressar dem.

NATURLIG UTBREDNING

Salomonöarna och Papua Nya Guinea.