herpy

SKINKAR

Tribolonotus schmidti

Tribolonotus schmidti är en liten, skygg skink från Guadalcanal på Salomonöarna med två rader plattformade fjäll längs ryggen. Den lever gömd i det fuktiga lövlagret på skogsbotten och föder levande ungar, en åt gången, till skillnad från de två bättre kända släktingarna, som lägger ägg.

Familj: Scincidae Engelska: Schmidt's Crocodile Skink Tidigare namn: *Pediporus schmidti* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**9-10 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Värmeplats	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**1 ungar**
Dräktighet	**65-85 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Tribolonotus schmidti*. Arten lever i varm, fuktig skog på Guadalcanal och måste antas ha samma krav som de nära släktingarna *Tribolonotus gracilis* och *Tribolonotus novaeguineae*.

TEMPERATUR

Håll terrariet för *Tribolonotus schmidti* på 24-27 °C på dagen, med ett varmt gömsle på 27-28 °C, och låt temperaturen sjunka till 22-24 °C på natten.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

För *Tribolonotus schmidti* ska luftfuktigheten vara 70-90 %, och bottensubstratet ska alltid vara fuktigt.

LJUS OCH UVB

Tribolonotus schmidti sover på natten och är sannolikt aktiv på dagen och i skymningen i det skuggiga lövlagret. UVB är inte dokumenterat för arten, men ett svagt UVB-ljus (Ferguson-zon 1) rekommenderas efter släktingarna.

UTFODRING

Tribolonotus schmidti är insektsätare. Grundfodret kan vara syrsor, kackerlackor, mjölmaskar, små larver och daggmaskar. Snäckor och maskar kan erbjudas som omväxling. Unga djur utfodras varje dag, vuxna varannan dag.

BETEENDE OCH HANTERING

Tribolonotus schmidti är en skygg skink som lever gömd, och som är ett djur att titta på och inte för hantering. Släktet kan ge ifrån sig läten, men det är inte dokumenterat för arten. Ge ett nytt djur minst två veckors lugn.

NATURLIG UTBREDNING

Salomonöarna.