herpy

SKÖLDPADDOR

Red-Footed Tortoise

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis carbonarius är en medelstor, mörk landsköldpadda från Sydamerikas savanner och skogsbryn med röda till orange fjäll på huvud och ben. Skölden blir vanligtvis 30-35 cm lång, djuret lever i minst 50 år och är en av de mest hållna tropiska landsköldpaddorna. Den behöver hög luftfuktighet och värme hela året och äter både växter, frukt och lite animalisk föda.

Familj: Testudinidae Tidigare namn: *Chelonoidis carbonaria; Geochelone carbonaria; Testudo carbonaria*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-45 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**50-70 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Savann, torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**280 × 140 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter, frukt, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**2-7 ägg**
Inkubation	**105-200 dagar** vid 28-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Ej bedömd (NE)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Chelonoidis carbonarius är en aktiv sköldpadda som använder allt utrymme den får. Den lever på marken, så golvyta är viktigare än höjd. I Norden är det inomhusterrariet djurets egentliga hem större delen av året.

TEMPERATUR

Inomhus ska det finnas en gradient. Lufttemperaturen är 24-29 °C på dagen, och solplatsen under värmelampan är 32-35 °C, mätt på själva underlaget.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten kommer från ett varmt och fuktigt klimat och ska ha hög luftfuktighet: 70-90 %, med korta toppar upp mot 100 %.

LJUS OCH UVB

C. carbonarius är dagaktiv och ska ha UVB när den inte är i direkt sol. Mät UV-indexet 2,0-3,0 på solplatsen (Ferguson-zon 2).

UTFODRING

C. carbonarius är allätare och äter i naturen växter, blommor, frukt, svampar och lite animalisk föda. I fångenskap fungerar en fördelning på omkring 90 % växtmaterial och 10 % animalisk föda.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är nyfiken, aktiv och förhållandevis lugn. Den lär sig känna igen sin ägare, kommer gärna fram när det finns mat och tar mat från en hand eller en pincett.

NATURLIG UTBREDNING

Panama, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Franska Guyana, Brasilien, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina och Trinidad och Tobago.