herpy

SKÖLDPADDOR

Painted Turtle

Chrysemys picta

Chrysemys picta är en dagaktiv, halvt vattenlevande sköldpadda från Nordamerika med röda och gula ränder på hals, ben och sköldkant. Skölden blir 13-25 cm, och djuret kan leva i många decennier. Ett vuxet djur kräver ett stort, filtrerat kar med flera hundra liter vatten, en varm solplats och kraftig UVB.

Familj: Emydidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-25 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**300-500 g**
Livslängd	**25-40 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**130 × 65 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-30 °C**
Värmeplats	**30-40 °C**
Temperatur, natt	**15-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 25-35 cm
Vattentemperatur	**21-27 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, färdigfoder, växter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**4-15 ägg**
Kullar per år	**1-5**
Inkubation	**72-80 dagar** vid 25-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Håll djuret i ett akvarium, ett stort kar eller en sluten inomhusdamm, inte i ett vanligt terrarium.
TEMPERATUR	Solplatsens yta ska vara omkring 40 °C, mätt med en infraröd termometer ett par timmar efter att lamporna tänts, och luften ovanför solplatsen 30-35 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Sköldpaddans fuktighet är själva vattnet, så luftens relativa fuktighet är inte närmare dokumenterad för arten och är inte avgörande; 50-80 % i rummet är mer än nog. Det avgörande är vattnets renhet.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet är djurets vistelseplats, så det ska vara djupt, rent och varmt. Vattnet ska vara minst dubbelt så djupt som ryggskölden är bred, och 25-35 cm passar för fullvuxna djur. Temperaturen är 24-27 °C (se Temperatur).
LJUS OCH UVB	UVB är en nödvändighet. Arten tillhör Ferguson-zon 3-4. UV-indexet på solplatsens yta ska ligga på omkring 3,0-4,0, och det får gärna finnas områden med lägre UV-index så att djuret kan välja.
UTFODRING	*C. picta* är allätare. I naturen äter den vattenväxter, alger, vatteninsekter, kräftdjur, snäckor, små fiskar och as. De unga djuren är mest köttätande, och med åldern blir kosten mer växtbaserad.
BETEENDE OCH HANTERING	*C. picta* är dagaktiv, skygg och snabb att fly ner i vattnet. Den är inte tam och trivs inte med kontakt, så den ska bara hanteras när det är nödvändigt, till exempel vid hälsokontroll eller rengöring.
NATURLIG UTBREDNING	Kanada, USA och Mexiko.