herpy

SKÖLDPADDOR

Bell's Hinge-back Tortoise

Kinixys belliana

Kinixys belliana är en medelstor afrikansk landsköldpadda med en avlång sköld och ett rörligt gångjärn baktill som kan stänga skölden över bakben och svans. Skölden är 15-22 cm lång. Arten lever i savann med tydlig regntid och torrtid, kräver stabil värme och en viss fuktighet och stressas lätt. Nyimporterade djur bär ofta på många parasiter.

Familj: Testudinidae Tidigare namn: *Cinixys belliana; Kinixys schoensis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-22 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**30-50 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**28-32 °C**
Värmeplats	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter, frukt, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-6 ägg**
Kullar per år	**1-2**
Inkubation	**105-200 dagar** vid 28-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Ej bedömd (NE)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite säker kunskap om skötseln av *Kinixys belliana*, eftersom mycket av den äldre kunskapen kommer från tiden då flera arter räknades som en.

TEMPERATUR

Djuret ska hållas varmt. På dagen ska det vara 28-32 °C, och solplatsen är 32-35 °C, mätt på underlaget. Nattemperaturen är inte dokumenterad för arten; 22-24 °C passar ett tropiskt klimat.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Som savannart är *K. belliana* mindre fuktkrävande än skogsarterna *Kinixys homeana* och *Kinixys erosa*, men den gillar fukt och ska sprayas regelbundet.

LJUS OCH UVB

K. belliana är dagaktiv, men mest framme tidigt och sent på dagen när ljuset är svagt. Solljus är bäst, men inomhus är UVB-ljus nödvändigt: UV-index 2,0-3,0 på solplatsen (Ferguson-zon 2).

UTFODRING

K. belliana är allätare, och ungar är nästan uteslutande köttätare.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är skygg och drar sig in i skölden eller gräver ner sig när den blir störd. Den är mest aktiv tidigt på morgonen och sent på dagen.

NATURLIG UTBREDNING

Angola, Burundi, Centralafrikanska republiken, Kongo-Kinshasa, Eritrea, Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Sydsudan, Sudan, Uganda, Tanzania och Malawi.