herpy

SKÖLDPADDOR

Eastern Mud Turtle

Kinosternon subrubrum

Kinosternon subrubrum är en liten, mörk sumpsköldpadda från sydöstra USA. Skölden blir 8-12 cm, och arten går mest längs botten av lågt, växtbevuxet vatten. Den har två rörliga gångjärn på bukskölden, så att den kan stänga in sig nästan helt, och den kan leva 20-50 år. Arten är skygg och mest aktiv i skymningen och ska ha ett filtrerat kar med lågt vatten, värmelampa och UVB.

Familj: Kinosternidae Tidigare namn: *Kinosternon pensylvanicum*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8-12 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**90-260 g**
Livslängd	**20-50 år**
Aktiv	**I skymningen**
Levnadssätt	**Grävande och semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**30-33 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 15-20 cm
Vattentemperatur	**21-24 °C**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter, färdigfoder, växter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36-96 mån.**
Kullstorlek	**2-5 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**75-125 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	*Kinosternon subrubrum* hålls i ett akvarium eller ett lågt kar med landdel, inte i ett vanligt terrarium.
TEMPERATUR	Vattnet ska vara 21-24 °C, och en vattenvärmare med skydd är normalt nödvändig. Solplatsen ska vara 30-33 °C mätt på ytan, och luften i karet 24-29 °C på dagen. På natten får temperaturen sjunka till 20-24 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten betyder lite för en vattensköldpadda; 40-60 % i rummet är lämpligt. Luften ovanför karet får inte vara kall eller dragig, eftersom det ökar risken för luftvägsinfektioner. Vattnet ska vara klart och rent.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet är 15-20 cm djupt för vuxna djur, med platta och lägre partier där djuret kan vila och sträcka upp halsen till ytan. Arten är en svag simmare, så djupt vatten ger stress. Temperaturen är 21-24 °C (se Temperatur).
LJUS OCH UVB	UVB rekommenderas, så att djuret kan bilda D3-vitamin och ta upp kalk, och solplatsen ska ha både värmelampa och UVB-rör, även om arten bara solar sig sällan.
UTFODRING	*Kinosternon subrubrum* är allätare men övervägande köttätare. I naturen äter den sniglar, musslor, maskar, insekter, spindlar, kräftdjur, grodyngel, kadaver, alger, vattenväxter och frön.
BETEENDE OCH HANTERING	*Kinosternon subrubrum* är skygg och aktiv, särskilt i skymningen, och syns mest när den undersöker botten. Den är inte ett djur att ta upp: den kan bita hårt med hornnäbben och avge en illaluktande vätska.
NATURLIG UTBREDNING	USA.