herpy

SKÖLDPADDOR

Balkan Terrapin

Mauremys rivulata

Mauremys rivulata är en medelstor, dagaktiv sötvattensköldpadda från Balkan och östra Medelhavsområdet. Honorna når omkring 24 cm sköldlängd, hanarna omkring 19 cm. Arten är härdig och tål många slags vatten, men kräver ett stort, filtrerat akvaterrarium med en varm solplats och UVB. På sommaren kan den hållas utomhus i en stängd damm.

Familj: Geoemydidae Tidigare namn: *Mauremys caspica rivulata; Emys rivulata*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-24 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-30 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 65 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 25-40 cm
Vattentemperatur	**21-27 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, färdigfoder, växter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**4-10 ägg**
Kullar per år	**2-3**
Inkubation	**49-77 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Ej bedömd (NE)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Håll djuret i ett stort akvaterrarium, ett kar eller en sluten damm, inte i ett vanligt terrarium.
TEMPERATUR	Vattnet ska vara 21-27 °C. Luften över vattnet ska vara 24-29 °C, och ytan på solplatsen ska nå 30-35 °C, mätt med en infraröd termometer. På natten får luften sjunka till 20-24 °C, och på vintern något mer.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Sköldpaddans fuktighet är vattnet självt. Luftens relativa fuktighet är inte dokumenterad för arten, och 50-70 % i rummet är en uppskattning.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet är djurets vistelseplats, så det ska vara djupt, rent och varmt. Vattnet ska vara minst dubbelt så djupt som ryggsköldens är bred, och 25-40 cm passar för fullvuxna djur; ungar ska ha lägre vatten.
LJUS OCH UVB	UVB är ett måste: det gör det möjligt för djuret att bilda D3-vitamin, ta upp kalk och få en frisk sköld. Fergusonzonen är inte dokumenterad för arten; zon 3 är en uppskattning utifrån att arten solar sig mycket.
UTFODRING	*Mauremys rivulata* är allätare. I naturen är unga djur övervägande köttätare, medan vuxna i högre grad äter växter.
BETEENDE OCH HANTERING	*Mauremys rivulata* är dagaktiv och skygg: den dyker blixtsnabbt när den störs. Släktet är intelligent och lär sig att förknippa dig med mat. Djuret tycker inte om att hanteras.
NATURLIG UTBREDNING	Albanien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Grekland, Israel, Palestinska territorierna, Jordanien, Libanon, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien, Syrien och Turkiet.