herpy

SKÖLDPADDOR

River Cooter

Pseudemys concinna

Pseudemys concinna är en stor, dagaktiv sötvattensköldpadda från floder och sjöar i östra och centrala USA, med en platt sköld prydd av gula virvlar. Skölden kan bli över 40 cm, och djuret kan leva i flera decennier. Ett vuxet djur kräver ett mycket stort, filtrerat kar med flera hundra liter vatten, en varm solplats, kraftig UVB och en övervägande växtbaserad kost.

Familj: Emydidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**22-44 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-44 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**220 × 110 × 70 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-31 °C**
Värmeplats	**30-40 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 30-45 cm
Vattentemperatur	**21-31 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, färdigfoder, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**10-20 ägg**
Kullar per år	**1-6**
Inkubation	**80-150 dagar** vid 26-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Håll djuret i ett stort akvarium, ett kar eller en sluten inomhusdamm, inte i ett vanligt terrarium. Temperaturer, ljus och utfodringsschema är lånade från den nära släktingen *Trachemys scripta*, som lever i samma vatten.

TEMPERATUR

Solplatsens yta ska vara omkring 40 °C, mätt med en infraröd termometer ett par timmar efter att lamporna tänts, och luften över den 30-32 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Sköldpaddans fukt är själva vattnet, så luftens fuktighet är inte avgörande; 50-80 % i rummet är lämpligt. Det avgörande är vattnets renhet.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Vattnet är djurets vistelseplats, så det ska vara djupt, rent och varmt. Vattnet ska vara minst dubbelt så djupt som ryggskölden är bred, och 30-45 cm passar för fullvuxna djur.

LJUS OCH UVB

UVB är en nödvändighet. Arten är dagaktiv, solar sig mycket och hör till Ferguson-zon 3. UV-indexet på solplatsens yta ska vara 3,0-4,0 och lägre på andra ställen i anläggningen, så att djuret kan välja.

UTFODRING

P. concinna äter i naturen mest vattenväxter, gräs och alger och tar också växter vid vattenkanten och nedfallen frukt; den har tandliknande uddar i överkäken som hjälper till att riva sönder fibrösa blad.

BETEENDE OCH HANTERING

P. concinna är dagaktiv och mycket skygg: vid den minsta rörelse eller ljud glider den från solplatsen ner i vattnet. Den tycker inte om att hanteras och ska bara lyftas när det är nödvändigt.

NATURLIG UTBREDNING

USA.