herpy

SKÖLDPADDOR

Florida Red-bellied Cooter

Pseudemys nelsoni

Pseudemys nelsoni är en stor, dagaktiv sötvattensköldpadda från stilla sjöar, dammar och kärr med tät växtlighet i Florida och yttersta sydöstra Georgia. Ryggsköldens är hög och mörk med röda ränder, och bukskölden är gulorange till rödaktig. Honan kan nå 38 cm sköldlängd, och vuxna djur är växtätare. Ett vuxet djur kräver ett mycket stort, filtrerat kar, en varm solplats och kraftigt UVB.

Familj: Emydidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-38 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-33 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**200 × 100 × 70 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-31 °C**
Värmeplats	**30-40 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 30-45 cm
Vattentemperatur	**21-31 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, färdigfoder, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36-96 mån.**
Kullstorlek	**7-26 ägg**
Kullar per år	**3-6**
Inkubation	**45-80 dagar** vid 25-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Håll djuret i ett stort akvarium, ett kar eller en sluten inomhusdamm, inte i ett vanligt terrarium.
TEMPERATUR	Hos *Pseudemys nelsoni* ska solplatsens yta vara omkring 40 °C, mätt med en infraröd termometer ett par timmar efter att lamporna tänts, och luften ovanför 30-32 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	*Pseudemys nelsoni* lever i vattnet, så luftfuktigheten är inte avgörande; 50-80 % i rummet är lämpligt. Det avgörande är vattnets renhet.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	*Pseudemys nelsoni* lever i vattnet, så det ska vara djupt, rent och varmt. Vattnet ska vara minst dubbelt så djupt som ryggsköldens är bred, och 30-45 cm passar för fullvuxna djur.
LJUS OCH UVB	UVB är en nödvändighet. *Pseudemys nelsoni* är dagaktiv, solar sig mycket och hör till Ferguson-zon 3. UV-indexet på solplatsens yta ska vara 3,0-4,0 och lägre på andra ställen i anläggningen, så att djuret kan välja.
UTFODRING	*Pseudemys nelsoni* är en uttalad växtätare. Bortsett från de allra minsta ungarna, som också tar små insekter, äter den i naturen bara vattenväxter som vallisneria, vattenpest, andmat och pilblad samt alger.
BETEENDE OCH HANTERING	*P. nelsoni* är dagaktiv och solar sig i stora grupper. Den är skygg och glider vid minsta störning från solplatsen ner i vattnet, men vänjer sig vid fasta rutiner.
NATURLIG UTBREDNING	USA.