herpy

ORMAR

Kungsboa

Boa constrictor

Boa constrictor är en kraftig boa från Sydamerika, framför allt öster om Anderna, brun till grå med mörka sadelmärken och en svans som hos många lokalformer är rödbrun till röd. Den blir 180-300 cm, är aktiv i skymning och på natten och lever 20-30 år. Den är större än den nära släktingen *Boa imperator*, kräver ett stort terrarium, sällsynta måltider och en hållare som kan ta ansvar i decennier.

Familj: Boidae Engelska: Boa Constrictor Tidigare namn: *Constrictor constrictor* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**180-300 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-30 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Savann, torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**240 × 120 × 120 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**55-75 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**18-48 mån.**
Kullstorlek	**10-65 ungar**
Dräktighet	**100-120 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur över 240 cm ska ha ett terrarium på minst 240 × 120 × 120 cm (längd × bredd × höjd), och mindre vuxna djur på 180-240 cm minst 180 × 90 × 90 cm.

TEMPERATUR

Det ska finnas en gradient från kallt till varmt. Luften vid solplatsen ska vara 30-32 °C och den kalla änden 24-26 °C, och hela terrariet bör rymma zoner mellan 24 och 32 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 55-75 % och variera något. Kortvarigt över 70 % skadar inte om terrariet får torka ut, medan ihållande fukt ger mögel. Före hudömsning kan 75-85 % hjälpa djuret att ömsa i ett stycke.

LJUS OCH UVB

Arten är nattaktiv och behöver inte kraftigt ljus, men UVB rekommenderas. Den hör till Ferguson-zon 2: tillfälligt solbad. Målet är ett UV-index på 2-3 vid solplatsen.

UTFODRING

B. constrictor är en köttätare och ska ha hela bytesdjur. Unga djur får möss och små råttor, och vuxna djur får råttor, unga kaniner, marsvin, kycklingar och vaktlar. Variation är hälsosamt.

BETEENDE OCH HANTERING

B. constrictor är en klok, individuell orm. Vissa djur tål och tycker om hantering, andra vill helst ha ro. Ungar och unga djur är ofta nervösa och kan väsa och bita. Konsekvent, mild hantering gör dem lugna.

NATURLIG UTBREDNING

Colombia, Venezuela, Guyana, Franska Guyana, Surinam, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Argentina och Trinidad och Tobago.