herpy

ORMAR

Corallus caninus

Corallus caninus är en smal, trädlevande boa från Guyanaskölden i Sydamerika. Vuxna djur är ljusgröna med vita tecken, ungarna är rödorange. Arten blir omkring 120-200 cm. Sedan 2009 omfattar namnet bara bestånden norr om Amazonfloden, medan djuren i Amazonområdet hör till *Corallus batesii*. Arten kräver ett stort, högt och fuktigt terrarium och en erfaren hållare.

Familj: Boidae Engelska: Emerald Tree Boa Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**120-200 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**180 × 60 × 120 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**75-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**36-60 mån.**
Kullstorlek	**5-20 ungar**
Dräktighet	**180-210 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 180 × 60 × 120 cm (längd × bredd × höjd), och större och framför allt högre är bättre.

TEMPERATUR

Corallus caninus behöver jämn värme i hela terrariet och en tydlig solplats. Solplatsen, en vågrät gren under värmekällan, ska vara 29-32 °C. Resten av terrariet ska på dagen vara 24-28 °C, med omkring 22-24 °C i den svala änden.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara hög och stabil: 75-90 %. Uppgifterna varierar från 65-75 % till 75-90 %, men arten tål växlande fukt dåligt, och stabiliteten är viktigare än det exakta talet.

LJUS OCH UVB

Arten är nattaktiv och klarar sig utan UVB, men ett svagt UVB-ljus ger en tydligare dygnsrytm och säkrar D3-vitamin. Arten tillhör Ferguson-zon 2, med ett UV-index på omkring 2-3 vid solplatsen.

UTFODRING

Corallus caninus ska ha hela bytesdjur: möss, råttor, hamstrar, gerbiler, vaktlar och kycklingar, och råttor är det bästa fodret.

BETEENDE OCH HANTERING

Corallus caninus är ofta nervös och försvarsberedd, särskilt som ung, och är inget djur för frekvent hantering. Känner den sig hotad lägger den sig i en S-formad ställning och hugger. De mycket långa framtänderna ger djupa sår.

NATURLIG UTBREDNING

Guyana, Surinam, Franska Guyana, Venezuela och Brasilien.