herpy

ORMAR

## Kenyansk sandboa

# *Eryx colubrinus*

*Eryx colubrinus* är en liten, kraftigt byggd boa från Östafrikas torra områden. Den tillbringar största delen av tiden nedgrävd i sand med bara de uppåtvända ögonen över ytan. Den är lugn, kräver inte mycket utrymme och kan bli 20-30 år gammal, så den är ett bra val för den som vill ha sin första orm.

Familj: Boidae  Engelska: Kenyan Sand Boa  Tidigare namn: *Gongylophis colubrinus; Eryx thebaicus*  Publicerad 16 november 2026

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **40-65 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Livslängd | **20-30 år** |
| Aktiv | **I skymningen och på natten** |
| Levnadssätt | **Marklevande och grävande** |
| Biotop | **Öken och halvöken** |
| Svårighetsgrad | **Nybörjare** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H för 1 vuxet djur |
| Temperatur, dag | **26-28 °C** |
| Värmeplats | **33-35 °C** |
| Temperatur, natt | **22-25 °C** |
| Luftfuktighet | **20-40 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Rekommenderas**<br>Fergusonzon 2 |
| Föda | **Ryggradsdjur** |
| Hålls | **Ensamma** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Levandefödande** |
| Kullstorlek | **10-20 ungar** |
| Kullar per år | **1** |
| Dräktighet | **120-180 dagar** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| EU-bilaga | **Bilaga B** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

En vuxen *Eryx colubrinus* behöver ett terrarium på minst 60 × 30 × 30 cm (längd × bredd × höjd), gärna 90 × 45 × 45 cm. Honor som är större än genomsnittet behöver mer än minimimåttet.

**TEMPERATUR**

*Eryx colubrinus* tål torra, varma förhållanden. Det ska finnas en varm och en sval ände. Ytan under värmekällan ska vara 33-35 °C och den svala änden 26-28 °C. På natten får temperaturen sjunka till 22-25 °C.

**LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN**

*Eryx colubrinus* lever i ett torrt klimat, och terrariet ska vara torrt största delen av tiden. Luftfuktigheten ligger bäst omkring 20-40 %. Siffran är en uppskattning utifrån levnadsmiljön.

**LJUS OCH UVB**

*Eryx colubrinus* är mest aktiv i skymningen och på natten och kan leva utan UVB, men ett svagt UVB-rör rekommenderas, eftersom det stöder dygnsrytmen och täcker behovet av D3-vitamin.

**UTFODRING**

*Eryx colubrinus* är köttätare och tar hela byten. Basfodret är möss: vuxna honor kan ta en stor vuxen mus, vuxna hanar en stor hoppermus.

**BETEENDE OCH HANTERING**

*Eryx colubrinus* är lugn och biter sällan. Låt nya djur vänja sig i två veckor och börja hantera dem först när de äter regelbundet.

**NATURLIG UTBREDNING**

Egypten, Sudan, Sydsudan, Etiopien, Eritrea, Kenya, Tanzania och Somalia.