herpy

ORMAR

Lampropeltis californiae

Lampropeltis californiae är en slät, glänsande kungsorm från västra Nordamerika, svart eller mörkbrun med vita till ljusgula tvärband eller en enda vit ryggrand. Den blir 75-120 cm, äter gnagare och andra ormar och är robust och tål hantering väl. Den lever mer än 20 år och sköts i ett golvterrarium med värmeplats och måttlig luftfuktighet.

Familj: Colubridae Engelska: California Kingsnake Tidigare namn: *Lampropeltis getula californiae* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**75-120 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På dagen, i skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Halvöken och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-28 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**5-15 ägg**
Inkubation	**60-70 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd). Större är bättre, för arten är aktiv och utforskar hela terrariet.

TEMPERATUR

Djuret reglerar sin temperatur genom att flytta mellan varma och kalla platser, så terrariet ska ha en tydlig gradient. Ytan under värmelampan ska vara 29-32 °C, mätt med en infraröd termometer, och den kalla änden 21-26 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 40-60 %, mätt med en digital hygrometer mitt i terrariet. Den är högre i den kalla änden och på natten och lägre i den varma änden, och det är normalt.

LJUS OCH UVB

Arten hör till Ferguson-zon 2: den solar sig ibland och får lite solljus i naturen. Den klarar sig utan UVB, men UVB rekommenderas för bästa välfärd.

UTFODRING

L. californiae är köttätare och ska ha hela bytesdjur. Den viktigaste födokällan i fångenskap är möss, och när djuret växer används unga råttor.

BETEENDE OCH HANTERING

L. californiae är robust och tolerant, och det är en av anledningarna till att den är bland de mest hållna ormarna. Ge ett nytt djur omkring 2 veckors ro, och börja först hantera när det äter regelbundet.

NATURLIG UTBREDNING

USA och Mexiko.