herpy

ORMAR

Grön trädpyton

Morelia viridis

Morelia viridis är en ljusgrön, trädlevande pyton från regnskogarna i södra Nya Guinea och på Cape York, som vilar i tätt hoprullade veck över en gren och slår till mot bytet från en fast utkikspunkt. Ungarna är gula och blir gröna under det första levnadsåret. Arten är vacker och tålig, men ställer krav på fukt, lugn och hantering.

Familj: Pythonidae Engelska: Green Tree Python Tidigare namn: *Chondropython viridis; Python viridis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**100-160 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**27-31 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**29-43 mån.**
Kullstorlek	**6-32 ägg**
Kullar per år	**1**
Inkubation	**39-65 dagar** vid 29-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 90 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd). Större är bättre, och 120 × 60 × 60 cm är ett bra mått för en vuxen hona.

TEMPERATUR

Det ska finnas en tydlig gradient. Solplatsen på den översta grenen ska hålla 27-31 °C och den svalare delen av terrariet 24-26 °C. På natten stängs värmen av, och temperaturen får sjunka till 20-22 °C, men inte under 20 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 40-70 % och variera: högre precis efter besprutning och sedan sjunkande till omkring 40 %, innan det sprutas igen.

LJUS OCH UVB

Unga djur är dagaktiva, och vuxna djur är mest aktiva i skymningen och på natten, men båda har nytta av ett klart dagsljus. Ljuset ska vara tänt 12 timmar per dygn och släckt helt på natten.

UTFODRING

M. viridis äter hela bytesdjur. Vuxna djur får möss, små råttor, hamstrar, gerbiler och vaktlar, gärna i omväxling, och ungar får små möss. Bytet ska vara upptinat från frys och värmt till cirka 38 °C.

BETEENDE OCH HANTERING

Morelia viridis är skygg och stationär. Den blir sällan lika tam som många ormar av andra grupper och ska inte hanteras varje dag. Den har rykte om sig att bita, men det är oftast en följd av hårdhänt behandling.

NATURLIG UTBREDNING

Indonesien, Papua Nya Guinea och Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/slanger/morelia-viridis