herpy

ORMAR

Blodpyton

Python brongersmai

Python brongersmai är en kraftig, kortsvansad pyton från sumpmarker och skogar i Sydöstasien, röd, orange eller gulbrun med teckning i gult och beige. Den blir 120-180 cm, väger många kilo och äter gnagare. Den kan leva över 25 år och sköts i ett stort, slutet golvterrarium med stabil värme, 60-70 % luftfuktighet och en stor vattenskål.

Familj: Pythonidae Engelska: Blood Python Tidigare namn: *Python curtus brongersmai* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**120-180 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-30 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**25-26 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36-48 mån.**
Kullstorlek	**12-30 ägg**
Inkubation	**60-75 dagar** vid 31-32 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 120 × 60 × 45 cm (längd × bredd × höjd). Arten använder bara golvet, så golvytan är det viktigaste, och terrariet ska vara bredare än högt. Stora honor ska ha en golvyta på 150 × 60 cm.

TEMPERATUR
Arten trivs vid stabila, måttliga temperaturer och tål för stor värme dåligt. Hela terrariet hålls på 26-28 °C på dagen och 25-26 °C på natten.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Luftfuktigheten ska ligga på 60-70 %, mätt med en digital hygrometer mitt i terrariet. Arten ska inte hållas våt: för fuktigt ger skrynklig, blank hud och luftvägsinfektioner, och för torrt ger hudömsningsproblem.

LJUS OCH UVB
Arten är skymnings- och nattaktiv och har inte visat sig kräva UVB. Vanligt ljus i ett rum med en naturlig dygnsrytm räcker, och ljuset tänds omkring 12 timmar. Ge inte ljus på natten.

UTFODRING
P. brongersmai är köttätare och ska ha hela bytesdjur. Råttor är det ideala bytesdjuret under hela livet; nykläckta ungar tas ofta med hoppermöss och byter inom några måltider till råttungar.

BETEENDE OCH HANTERING
P. brongersmai kräver en lugn och bestämd ägare. Ge ett nytt djur omkring 2 veckors ro, och börja hantera först när det äter regelbundet. Håll de första tillfällena korta, några få minuter.

NATURLIG UTBREDNING
Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam.