herpy

ORMAR

Strumpebandssnok

Thamnophis sirtalis

Thamnophis sirtalis är en smal, dagaktiv och nyfiken orm med ljusa ränder längs kroppen. Den lever vid vatten från södra Kanada genom större delen av USA till norra Mexiko. Den är härdig, håller sig vaken och synlig om dagen och kan leva på upptinade möss, men den är en mästare på att rymma och kräver ett helt tätt terrarium.

Familj: Colubridae Engelska: Common Garter Snake Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**50-100 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**6-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**35-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**8-15 °C** 8-16 veckor
Föda	**Ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**18-24 mån.**
Kullstorlek	**10-40 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**60-90 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

En vuxen *Thamnophis sirtalis* ska ha ett terrarium på minst 100 × 50 × 50 cm (längd × bredd × höjd), och en hona över 80 cm ska ha 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR

Det ska finnas en tydlig värmegradient. Solplatsen ska vara 29-32 °C mätt på ytan, den svala änden 23-27 °C och natten 18-22 °C. Värmekällan släcks på natten.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 35-60 %, högst i den svala änden och på natten. Terrariet ska inte vara vått, för ihållande fukt ger blåsor på buken.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och trivs med kraftigt dagsljus. UVB är inte strängt nödvändigt, men rekommenderas och gör ofta ormen mer aktiv.

UTFODRING

Thamnophis sirtalis tar andra byten än de flesta ormar: daggmaskar, fisk och gnagare. Insekter som syrsor och mjölmaskar äter den inte.

BETEENDE OCH HANTERING

Thamnophis sirtalis är snabb och nyfiken och blir oftast tam om den hanteras regelbundet från ung ålder. Låt nya djur vänja sig i omkring två veckor, och börja först hantera dem när de äter fast.

NATURLIG UTBREDNING

Kanada, Mexiko och USA.