herpy

VARANER

Varanus beccarii

En liten, svart trädlevande varan från Aruöarna utanför Nya Guinea med gripsvans och ovanligt långa framben, som den använder som händer när den jagar. Djuret är nervöst, kräver ett högt och varmt terrarium med hög luftfuktighet och är svårt att få att fortplanta sig, så det passar bara en erfaren hållare.

Familj: Varanidae Engelska: Black Tree Monitor Tidigare namn: *Varanus prasinus beccarii; Monitor beccarii* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**80-120 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**220-300 g**
Livslängd	**10-17 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 100 × 150 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**55-70 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3 ägg**
Inkubation	**157-203 dagar** vid 29-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Kunskapsbrist (DD)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett högt terrarium på minst 150 × 100 × 150 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen i terrariet ska ligga omkring 26-30 °C, men får gärna variera från 24 till 35 °C över terrariet. Under en värmelampa ska det finnas en solplats på 35-40 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten i fångenskap ligger oftast på 55-70 % med variationer över dagen. Spraya botten dagligen med friskt vatten, så att luftfuktigheten stiger, och låt den torka upp något igen under dagen.

LJUS OCH UVB

Varanus beccarii är dagaktiv och bör ha UVB-ljus. Dokumenterade uppställningar använder en kombinerad värme- och UVB-lampa på 100-160 W över solplatsen, i vissa fall kompletterad med filtrerat dagsljus.

UTFODRING

Arten lever mest på levande insekter. Dokumenterat foder för vuxna är kackerlackor (till exempel *Blaptica dubia*), kompletterade med mjölmaskar, superormar (*Zophobas morio*), syrsor och larver av rosenskalbaggar (*Pachnoda*).

BETEENDE OCH HANTERING

Varanus beccarii är nervös och blir lätt stressad av hantering. Bett och klor är en reell risk: tänderna är långa, klorna vassa, och ett skrämt djur kan också sparka och släppa avföring på den som håller det.

NATURLIG UTBREDNING

Indonesien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/varaner/varanus-beccarii