herpy

VARANER

Varanus boehmei

En smal, svart trädvaran med gyllene fläckar i V-formade rader, som bara finns på ön Waigeo utanför Nya Guinea. Arten är sällsynt i fångenskap och dåligt känd, så skötselråden här bygger på siffror från nära släktingar. Den kräver ett stort, högt och fuktigt terrarium, daglig besprutning och en hållare med erfarenhet.

Familj: Varanidae Engelska: Golden speckled tree monitor Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**70-90 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 100 × 150 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Värmeplats	**38-45 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3 ägg**
Inkubation	**157-161 dagar** vid 29-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Kunskapsbrist (DD)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Varanus boehmei är en klättrare, så höjden är viktigare än golvytan. Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 150 × 100 × 150 cm (längd × bredd × höjd), och ett par ska ha mer, gärna omkring 160 × 120 × 180 cm.

TEMPERATUR

Siffrorna för *Varanus boehmei* är lånade från *V. beccarii* och andra arter i gruppen. På dagen ska lufttemperaturen vara 24-34 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arter i *V. prasinus*-gruppen torkar lätt ut och är svårare att hålla än många andra varaner.

LJUS OCH UVB

Varanus boehmei är sannolikt dagaktiv och solar sig högt uppe i träden, så ljus är både värme och UVB.

UTFODRING

Släktingar i gruppen lever mest av insekter och andra ryggradslösa djur, och det gäller sannolikt även *Varanus boehmei*. Över 90 % av fodret (i vikt) ska vara insekter som kackerlackor och larver av *Pachnoda* och *Zophobas*, och ibland kan man ge fisk, ägg (även med skal) eller en dagsgammal kyckling.

BETEENDE OCH HANTERING

Varanus boehmei är liten och lätt byggd, och ett vuxet djur på 70-90 cm har vassa klor och kan bita, men skadorna kan inte jämföras med dem från stora varaner.

NATURLIG UTBREDNING

Indonesien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/varaner/varanus-boehmei