herpy

VARANER

Bogert's Monitor

Varanus bogerti

Varanus bogerti är en svart, trädlevande varan från öarna utanför Nya Guineas sydöstra spets, och den hör till gruppen av trädvaraner kring *Varanus prasinus*. Arten är bara känd från en handfull museiexemplar och nästan okänd i fångenskap, så skötseln bygger på de närmaste släktingarna.

Familj: Varanidae Tidigare namn: *Varanus prasinus bogerti*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**82-94 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 80 × 180 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-34 °C**
Värmeplats	**45-50 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**70-95 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**2-3 ägg**
Inkubation	**157-203 dagar** vid 29-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Varanus bogerti*, och arten har knappt setts i fångenskap.
TEMPERATUR	På dagen ska temperaturen vara 24-34 °C och på natten 22-25 °C. Yttemperaturen på solplatserna ska vara 45-50 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara 70-95 %. Duscha terrariet flera gånger per dygn med färskt vatten, gärna med ett automatiskt system, och låt botten torka upp något mellan duschningarna. Djuren dricker vattendroppar från blad och grenar.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och ska ha UVB-ljus. Använd en kombinerad värme- och UVB-lampa över solplatsen, så att djuret kan välja mellan skugga och ljus, och sikta på Ferguson-zon 2.
UTFODRING	Utfodringen är lånad från *V. beccarii* och *V. prasinus*, som huvudsakligen äter stora leddjur.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är sannolikt skygg och nervös som andra trädvaraner, och hantering stressar djuret. Bett och klor är en verklig risk: tänderna är vassa, klorna är långa, och ett skrämt djur kan också släppa avföring på den som håller det.
NATURLIG UTBREDNING	Papua Nya Guinea.