herpy

VARANER

Varanus exanthematicus

En kraftig, markboende varan från savannerna i Västafrika och Centralafrika, som gräver djupa hålor och lever av snäckor, tusenfotingar och andra ryggradslösa djur. *Varanus exanthematicus* är den mest handlade varanen i världen, men också en av dem som oftast dör hos nya skötare. Den blir 60-100 cm, kräver ett stort, varmt terrarium med djupt substrat och trivs bäst med varierad, måttlig föda.

Familj: Varanidae Engelska: Savannah Monitor Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**60-100 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**750-3 600 g**
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**200 × 100 × 80 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-34 °C**
Värmeplats	**50-57 °C**
Temperatur, natt	**24-29 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**15-50 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**150-180 dagar** vid 30-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

En vuxen *Varanus exanthematicus* ska ha ett stort, markbaserat terrarium på minst 200 × 100 × 80 cm (längd × bredd × höjd), och mer är bättre. Ett par ska ha omkring 210 × 150 × 120 cm med 40 cm bottensubstrat.

TEMPERATUR

Varanus exanthematicus kommer från varma, öppna områden och behöver en tydlig temperaturgradient. På dagen ska lufttemperaturen i terrariet vara 29-34 °C, med en svalare ände på 26-28 °C. Under solplatsen ska ytan vara 50-57 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Varanus exanthematicus kommer från torra savanner, men hålor och djupt bottensubstrat håller sannolikt en högre luftfuktighet än ytan. Terrariet ska därför vara torrt på ytan och fuktigt längre ner.

LJUS OCH UVB

Som dagaktiv solälskare behöver *Varanus exanthematicus* starkt ljus och UVB-strålning. UVB är nödvändigt för kalkomsättningen.

UTFODRING

I naturen lever *Varanus exanthematicus* av ryggradslösa djur, och i fångenskap bör fodret likna det.

BETEENDE OCH HANTERING

Varanus exanthematicus är inte tam av naturen. Nyfångade djur blåser upp sig, fräser, slår med svansen och biter. Djuren är starka och har kraftiga käkar. Djupa bett kan kräva stygn och antibiotika.

NATURLIG UTBREDNING

Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Tchad, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Sudan, Sydsudan, Etiopien, Eritrea, Kenya, Uganda och Kongo-Kinshasa.