herpy

VARANER

Varanus glauerti

En smal, långbent klippvaran från Kimberley i nordvästra Australien, med mörkt huvud, blågrå ögonfläckar på ryggen och en svans med skarpa svarta och vita band. *Varanus glauerti* blir bara 60-80 cm, men den är krävande: den behöver ett stort, varmt och högt terrarium med klippytor och springor, och hållaren måste ha erfarenhet av UVB, äggkläckning och skygga djur.

Familj: Varanidae Engelska: Kimberley Rock Monitor Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**60-80 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och klipplevande**
Biotop	**Savann och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 80 × 100 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-32 °C**
Värmeplats	**45-55 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3-9 ägg**
Kullar per år	**1-4**
Inkubation	**104-110 dagar** vid 28,5-29,5 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 150 × 80 × 100 cm (längd × bredd × höjd). Ett par bör helst ha 190 × 100 × 105 cm. Större är bättre, eftersom djuret klättrar, springer och behöver en tydlig temperaturgradient.

TEMPERATUR

Varanus glauerti solar sig mycket och behöver varma solplatser. Yttemperaturen på solplatsen, mätt med IR-termometer, ska vara 45-55 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara 50-80 %, gärna 60-80 % för djur som används i avel. Uppgifterna för sprayning varierar från två gånger i veckan till dagligen. Ungarna är mer aktiva vid hög fuktighet och bör sprayas dagligen.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och kräver kraftigt UVB-ljus (Ferguson-zon 3).

UTFODRING

Arten lever mest på insekter. Vuxna djur matas 3-4 gånger i veckan med syrsor, dubiakackerlackor, gräshoppor och hornmask, och då och då en halvvuxen mus eller en nyfödd råttunge.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är skygg och ska vänjas vid hantering långsamt. De första veckorna efter hemkomsten ska djuret få vara i fred.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.