herpy

VARANER

Varanus jobiensis

Varanus jobiensis är en medelstor, dagaktiv varan från regnskogen på Nya Guinea och de närliggande öarna, känd för sin vitgula till röda strupe. Arten blir upp till omkring 120 cm, gräver gärna och behöver ett rymligt, fuktigt och varmt terrarium. Den hör hemma hos den erfarne hållaren, och bara få djur i handeln är uppfödda.

Familj: Varanidae Engelska: Peach-throated monitor Tidigare namn: *Varanus karlschmidti; Varanus indicus jobiensis* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**100-120 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**240 × 90 × 200 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-29 °C**
Värmeplats	**35-54 °C**
Temperatur, natt	**23-25 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3-5 ägg**
Inkubation	**179-181 dagar** vid 29-32 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur ska ha ett mycket stort terrarium på minst 240 × 90 × 200 cm (längd × bredd × höjd), gärna 240 cm högt, och ett par behöver mer. Ju större desto bättre, eftersom arten är aktiv och använder hela ytan.

TEMPERATUR

Varanus jobiensis ska ha en stor temperaturgradient. På dagen ska lufttemperaturen vara 26-29 °C, och det ska finnas flera solplatser med yttemperaturer på 35-54 °C, uppvärmda med 65-90 W utomhusspotlights.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten kommer från regnskog, och det ska terrariet spegla. Spruta hela terrariet kraftigt i flera minuter varje dag, till exempel med en trädgårdsslang, så att botten håller sig fuktig.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och behöver kraftigt ljus och UVB. Använd en UVB-källa med hög intensitet som till andra varaner, till exempel kvicksilverlampor, som ger både värme och UV, eller kraftiga UVB-rör av hög kvalitet.

UTFODRING

I naturen är insekter huvudfödan, kompletterat med grodor, andra ryggradslösa djur och kräldjursägg. I fångenskap tar djuren unga möss och kackerlackor (*Blaptica dubia*).

BETEENDE OCH HANTERING

Säkerhet och hantering: *Varanus jobiensis* är snabb och stark och har kraftiga klor och tänder. Bett och rivsår från klorna hos ett djur på omkring en meter kan vara djupa och ska rengöras noga.

NATURLIG UTBREDNING

Indonesien och Papua Nya Guinea.