herpy

VARANER

Varanus kordensis

Varanus kordensis är en smal, grön trädlevande varan med ett nät av mörka ringfläckar, och den lever bara på ön Biak norr om Nya Guinea. Den hör till en grupp trädvaraner som är kända för att vara svåra att hålla och föda upp, och det finns nästan inga detaljerade skötselsiffror för just den här arten.

Familj: Varanidae Engelska: Biak Emerald Monitor Tidigare namn: *Monitor kordensis; Varanus prasinus kordensis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**70-90 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 80 × 180 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-34 °C**
Värmeplats	**45-50 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**75-95 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12-24 mån.**
Kullstorlek	**2-5 ägg**
Kullar per år	**1-3**
Inkubation	**160-190 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Kunskapsbrist (DD)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Skötseln av *Varanus kordensis* är nästan densamma som för de andra gröna trädvaranerna: ett stort, högt terrarium med många gömslen, tjocka grenar och korkrör.

TEMPERATUR

Temperaturerna är lånade från *Varanus beccarii* och är en försiktig utgångspunkt för *Varanus kordensis*. På dagen ska temperaturen vara 24-34 °C och på natten 22-25 °C. Yttemperaturen under solplatserna ska vara över 45 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara hög, omkring 75-95 %, och bör inte understiga 75 %. Torra förhållanden ger uttorkning och problem med ömsningen.

LJUS OCH UVB

Varanus kordensis är dagaktiv och solar sig i trädkronorna. Behovet av UVB är inte känt för arten, men UVB rekommenderas.

UTFODRING

Varanus kordensis lever mest av insekter. I fångenskap består grundfodret av syrsor, kackerlackor, gräshoppor och ägg, och kyckling, kött, räkor och gnagare ges bara då och då.

BETEENDE OCH HANTERING

Varanus kordensis är så liten att ett bett sällan är allvarligt, men klorna är vassa och kan ge djupa rispor, och svansen används för att gripa med, inte för att piska. Djuren är snabba och skygga och flyr hellre än att bita.

NATURLIG UTBREDNING

Indonesien.