herpy

VARANER

Varanus melinus

Varanus melinus är en medelstor, gul varan från Sulaöarna i Indonesien. Vuxna djur är starkt gula, och ungarna är svarta med gula fläckar. Arten kräver ett stort terrarium med bassäng och mycket varma solplatser, lever av insekter och ryggradsdjur och är hotad i naturen, så den passar bara en erfaren hållare.

Familj: Varanidae Engelska: Banggai Island monitor Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**90-130 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**300 × 120 × 150 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-33 °C**
Värmeplats	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**24-26 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattendel** djup 80 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**2-12 ägg**
Inkubation	**164-171 dagar** vid 28-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett enskilt vuxet djur behöver minst 300 × 120 × 150 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Ett par behöver omkring 400 × 100 × 150 cm, som kan delas i två lika stora halvor så att djuren kan skiljas åt.

TEMPERATUR

Bakgrundstemperaturen i terrariet är 26-33 °C på dagen, och solplatsen under värmelamporna ska nå 40-45 °C mätt som yttemperatur med en IR-termometer.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara hög, omkring 60-80 % som hos besläktade arter i den grupp som omfattar *V. indicus*. Spraya ungarna dagligen med regnvatten; bassängen bidrar också till fukten.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar sig mycket. Ge UVB från lysrör eller värmelampor med UVB, så att djuret kan välja sin dos (Ferguson-zon 3).

UTFODRING

Arten är köttätare. Vuxna djur får ryggradsdjur (möss, fisk eller kycklingkött) en gång i veckan och däremellan insekter, särskilt gräshoppor och syrsor.

BETEENDE OCH HANTERING

Vuxna djur av den här storleken har tänder och klor som kan ge djupa sår, och svansen är hoptryckt och kan användas för att slå. Hur kraftiga bett och svansslag är hos just den här arten är inte dokumenterat.

NATURLIG UTBREDNING

Indonesien.