herpy

VARANER

Varanus mitchelli

Varanus mitchelli är en smal, halvt vattenlevande varan från norra Australien, vanligtvis 60-70 cm och högst omkring 1 m lång med en sammanpressad simsvans. Arten är blyg, nästan okänd i hobbyn och bedömd som akut hotad, eftersom giftet från den införda paddan *Rhinella marina* har decimerat bestånden. Det finns bara få erfarenheter av skötsel, och arten hör hemma hos den mycket erfarne.

Familj: Varanidae Engelska: Mitchell's water monitor Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**60-96 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och semiakvatisk**
Biotop	**Savann och våtmark**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**200 × 100 × 150 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**28-32 °C**
Värmeplats	**40-50 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Vattendel** djup 20-30 cm
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**7-27 ägg**
Kullar per år	**2-6**
Inkubation	**90-289 dagar** vid 26-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Akut hotad (CR)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Det finns nästan ingen dokumenterad erfarenhet av skötsel av *Varanus mitchelli*, och det följande är därför försiktigt lånat från en besläktad art, den torra *V. acanthurus*, och från den enda dokumenterade uppfödningen av arten.

TEMPERATUR
Temperaturförhållandena är inte dokumenterade för arten, och de siffror som anges här är en uppskattning utifrån det tropiska nordaustraliska klimatet och släktingar i samma undergrupp.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Luftfuktigheten är inte dokumenterad, men arten hör hemma vid vatten och i det tropiska norr, så en måttlig till hög fuktighet på omkring 50-80 % är en rimlig uppskattning.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Arten är halvt vattenlevande, så en fast vattendel är en del av terrariet och inte bara en dricksskål.

LJUS OCH UVB
Arten är dagaktiv och solbadar, så UVB rekommenderas starkt, men det finns inga dokumenterade siffror för just den.

UTFODRING
I naturen äter arten framför allt gräshoppor, spindlar och fisk, men också andra ryggradslösa djur, groddjur, kräldjur och deras ägg, små däggdjur och fåglar. Insekter är därför en bra grund, kompletterade med små fiskar.

BETEENDE OCH HANTERING
Varanus mitchelli är en blyg och försiktig art som gömmer sig mycket och inte är ett djur man tar upp varje dag.

NATURLIG UTBREDNING
Australien.