herpy

VARANER

Varanus spinulosus

Varanus spinulosus är en sällsynt och nästan okänd varan från Salomonöarna och Bougainville, känd på sin sandpappersartade, taggiga fjällstruktur och rader av stora gula fläckar på mörk botten. Skötseln bygger på besläktade arter, eftersom det knappt finns någon erfarenhet av arten i fångenskap.

Familj: Varanidae Engelska: Solomon Island spiny monitor Tidigare namn: *Varanus indicus spinulosus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**90-100 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**300 × 120 × 200 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Värmeplats	**40-48 °C**
Temperatur, natt	**24-25 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vatten	**Vattendel** djup 10-40 cm
Vattentemperatur	**26-29 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**4-7 ägg**
Inkubation	**150-195 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Måtten är lånade från besläktade, ca 100-140 cm långa varaner. Ett vuxet djur av *Varanus spinulosus* behöver ett hembyggt terrarium eller ett helt rum på minst 300 × 120 × 200 cm (längd × bredd × höjd).

TEMPERATUR

Temperaturerna för *Varanus spinulosus* är lånade från *V. juxtindicus* och andra arter i *V. indicus*-gruppen. Lufttemperaturen hålls på 27-30 °C på dagen och 24-25 °C på natten, och vattnet på 26-29 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten är lånad från besläktade arter: omkring 60-80 % på dagen och 85-98 % på natten. Faktarutan visar spannet 60-90 %. Det uppnås med en stor vattendel, fuktigt bottensubstrat och daglig besprutning.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Släktingarna i *V. indicus*-gruppen simmar och dyker flitigt och sover i vattnet, så en fast vattendel rekommenderas, även om arten inte är känd som semiakvatisk.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar i full sol mitt på dagen, så den behöver kraftigt ljus och UVB som vuxen.

UTFODRING

I naturen äter arten leddjur, ägg från storfotshöns, fisk och småfåglar. Den kommer ut ur skogen för att ta inälvor från rensad fisk, plundrar hönshus och söker föda i tidvattenzonen. Arten är en mångsidig, delvis asätande jägare.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är skygg i naturen och flyr upp i palmkronor. Ett fångat djur kan väsa och ändå snabbt lugna sig utan att försöka bita, men mer är inte känt om temperamentet.

NATURLIG UTBREDNING

Salomonöarna och Papua Nya Guinea.