herpy

VARANER

Varanus tristis

Varanus tristis är en liten, snabb och trädklättrande varan från Australiens torra inland med svart huvud och svans och en fin rödbrun nätteckning på ryggen. Den blir upp till 75 cm, är dagaktiv och kräver ett högt, varmt och soligt terrarium. Den är sällsynt i fångenskap, och det finns bara få pålitliga erfarenheter av skötsel och avel.

Familj: Varanidae Engelska: Black-tailed Monitor Tidigare namn: *Varanus punctatus; Varanus timorensis tristis; Odatria punctata*
Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**50-75 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**150-330 g**
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**150 × 60 × 120 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-32 °C**
Värmeplats	**42-50 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**8-12 ägg**
Inkubation	**114-117 dagar** vid 29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	En tumregel för trädlevande varaner är ett terrarium som är minst 5 gånger djurets nos-kloaklängd i längd, 2 gånger i bredd och 4 gånger i höjd.
TEMPERATUR	Temperaturerna för *Varanus tristis* är lånade från besläktade, torrlevande australiska dvärgvaraner och är en försiktig utgångspunkt. Mät alltid yttemperaturen på solplatsen med en IR-termometer.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Arten kommer från torra trakter och ska inte ha hög luftfuktighet. Omkring 30-50 % är en försiktig utgångspunkt.
LJUS OCH UVB	UVB är viktigt för dagaktiva varaner som solar sig mycket.
UTFODRING	I naturen är arten ett rovdjur på ödlor, fågelungar och ägg och tar sannolikt också insekter. I fångenskap är insekter det naturliga grundfodret: syrsor, gräshoppor, kackerlackor och superlarver.
BETEENDE OCH HANTERING	*Varanus tristis* är en snabb, nervös art, och vildfångade djur är ofta försvarsberedda och stressade. Djuren biter om de blir gripna, och klorna är långa och vassa och kan ge djupa rispor.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/varaner/varanus-tristis